

PLAGAS EN EL CESPED

Alguna de las plagas más importantes:



Gusano Blanco

- GUSANOS BLANCOS: Son larvas de insectos, se alimentan de las raíces y los adultos comúnmente de las hojas del césped. Se controlan un insecticida tipo clorpirifos.



Grillo Topo

- GRILLO TOPO(scapteriscus vicinus): Este insecto tiene hábitos nocturnos y pasa casi toda su vida en galerías subterráneas que cava con sus patas, en primavera realiza vuelos de apareamiento y luego la hembra coloca los huevos en las galerías a unos 15cm de profundidad.

Una vez que nacen las ninfas se alimentan de las raíces del césped. Los daños de este insecto aparecen como manchones de pasto muerto. Para su control se los hace salir de las galerías por medio de agua jabonosa y una vez afuera se los ataca con algún insecticida (deltametrina, clorpirifos y otros)

- ISOCAS: Su fuente de alimento son los tallos y las hojas, provocando defoliación y hasta la pérdida de la planta. Se controla con carbaril.

- ACAROS Y ARAÑUELAS: Son extremadamente pequeñas, se alimentan del césped produciendo manchas sobre las hojas que la pueden llevar a la muerte. Se controlan con Mercaptotión.

- CHINCHES: Su hábito de alimentación es succionando jugo vegetal y a la vez inyectan una saliva tóxica.



Pulgón

- PULGONES: También succionan e inyectan sustancias tóxicas, el más común es el pulgón verde. Los daños aparecen en las zonas sombreadas, donde el césped se pone amarillo y luego marrón.



Hormiguero

- HORMIGAS: Viven en colonias bajo la superficie donde excavan grandes galerías que dejan rastros en la superficie. Tienen hábito masticador.

- NEMATODES: Gusanos con formas de hilos, muy pequeños que pueden vivir en el suelo, en el agua y hasta dentro de un huésped. Debido a sus hábito favorecen la entrada de bacterias, virus y hongos a la planta. Los síntomas generales son el marchitamiento, detención del crecimiento, enrollamiento y muerte de la planta.
